



Quand et comment remplacer les dents antérieures ?

Parfois, à cause de caries ou d'un choc sur les dents, votre enfant peut être amené à perdre très précocement une ou plusieurs incisives. La question se pose alors de savoir s'il est nécessaire de remplacer provisoirement la ou les dents tombées et si oui, comment. Après tout, tous les enfants finissent par perdre leurs dents et les définitives vont pousser.



Pourquoi remplacer les dents ?

Les incisives temporaires ne servent pas qu'à avoir un joli sourire, même si cela est important pour acquérir de la confiance en soi.

Elles permettent aussi :

- De **maintenir la place** dans la bouche pour les futures dents définitives, en hauteur et en largeur
- Une **bonne phonation**, c'est-à-dire l'apprentissage d'une prononciation correcte, primordiale entre 2 et 4/5 ans
- Une **aide à la mastication**



Il faut savoir que la perte d'une seule incisive centrale temporaire n'impacte pas réellement la place dans la bouche, celle-ci étant garantie par les canines. On n'observe pas non plus de gêne phonétique avec une seule dent en moins. *Le remplacement d'une seule incisive temporaire ne se fera donc qu'avec une demande esthétique très importante de l'enfant et uniquement lui.* Ce sera lui qui aura la prothèse dans la bouche, s'il n'en ressent pas le besoin, pas la peine de l'embêter.

Cependant, **à partir de 2 dents manquantes, ou de la perte d'une incisive latérale**, il faut se poser la question du remplacement pour les raisons citées au-dessus.

Quand remplacer les dents ?

Pour pouvoir remplacer les incisives temporaires, nous avons besoin de nous appuyer en règle générale sur les 2^e molaires de lait de l'enfant. Celles-ci font leur éruption entre 2 ans et demi et 3 ans. De plus, nous avons besoin de la coopération de notre jeune patient et qu'il comprenne la situation. Nous n'interviendrons normalement donc pas pour remplacer les dents avant **3 ans**.

De même, les incisives permanentes font leur éruption en moyenne à partir de 6 ans et demi/ 7 ans. Sauf chez un enfant dont les radiographies prouveraient un fort retard d'âge dentaire, il n'est donc pas intéressant de mettre en place un appareil à partir de 5 ans.

Quand ne pas remplacer les dents, même si cela semble indiqué ?

Il ne sert à rien de forcer un enfant à réaliser une prothèse dont il ne veut pas : il ne l'entreprendra pas et finira pas la casser. Notre philosophie, en partenariat avec vous, parents, est d'expliquer, de visiter en visites, l'intérêt que cela peut avoir et les bénéfices qu'il en tirera.

De même, si le brossage et l'alimentation ne sont pas maîtrisés, le risque de caries est très important. La réalisation devra donc être reportée.





Docteur, c'est compliqué de faire une prothèse pédiatrique ?

La prothèse peut être **fixée** (dans la majorité des cas) ou **amovible**, comme un petit appareil orthodontique. La réalisation de la prothèse est facile et indolore. A la première séance, on réalise une **empreinte/ un moulage des dents du haut et du bas**, en expliquant à votre enfant que l'on fait de la pâte à modeler. Dans une deuxième séance, il ne nous reste qu'à coller l'appareil qui aura été réalisé par notre prothésiste (ou à l'installer s'il est amovible).



Docteur, quel est le prix ?

Les prothèses pédiatriques ne sont pas remboursées par la sécurité sociale mais peuvent l'être par certaines mutuelles, ou par votre assurance en cas de traumatisme. Nous vous fournirons donc un devis avant de débiter la réalisation de l'appareil afin que vous vous renseigniez.

Docteur, comment on entretient l'appareil ? Combien de temps le garde-t-on ?



Un fois collée, la prothèse pédiatrique doit être entretenue comme les autres dents : **brossage 2 à 3 fois par jour**, pour ne pas laisser d'aliments coincés au niveau des fausses dents, de la fausse gencive et des bagues et augmenter ainsi le risque de caries. Il est possible d'utiliser une brossette interdentaire pour nettoyer entre l'appareil et la gencive. Si la prothèse est amovible, il faut la nettoyer avec une brosse à dents et de l'eau après les repas.

Attention par contre, les caramels mous, malabars et autres bonbons kremas bien collants sont interdits, car l'appareil risque de finir collé dans la sucrerie 😬.

Des RDV de contrôle seront réalisés régulièrement et une fois la dent permanente proche à la radiographie, il pourra facilement être enlevé par votre dentiste.

Une visite de contrôle chez votre dentiste est nécessaire tous les 6 mois pour contrôler l'appareil et le reste des dents.